

HSC 2, HSC 3, HSC 4, SAS, SCC 9, SCC25) にコバルト60ガンマ線を 2, 5, 10Gy照射し, コロニー・アッセイ法で, 放射線感受性について検索した。その結果から放射線照射に抵抗性であるHSC 3, 4と感受性の高いKB, SCC 9 の 4 株を選び, p21およびBAG-1の発現について検討した。p21発現をnorthern blottingで検索したところ, 放射線感受性細胞株 (KB, SCC 9) ではベースレベルでその発現が頗著で, 照射によってさらに高発現

することが示された。また, BAG-1タンパクの発現をWestern blottingにより検索すると, 放射線抵抗性細胞株 (HSC 3, 4) では放射線感受性細胞株 (KB, SCC 9) に比較してBAG-1タンパクの強い発現がみられた。

《結論》今回の検索の結果, 口腔扁平上皮がん細胞株ではp21, BAG-1の発現量と放射線抵抗性の相関がみられ, これらは臨床的にも感受性の有無を検索する良い指標の一つとなると思われる。

27. ラット三叉神経侵害刺激時における血漿カテコールアミンの変動

○河合 拓郎, 新家 昇, 大桶 華子,
加藤 元康, 工藤 勝, 國分 正廣
(北海道医療大学歯学部歯科麻酔学講座)

《目的》歯科処置時には偶発症や基礎疾患の増悪を認めることがある。これは三叉神経領域への痛み刺激を与えた時に起こることが多いと考えられる。当講座では電気刺激をラットの三叉神経に与えた場合, 交感神経一副腎および腎臓神経系へ遠心性放電活動に影響を及ぼすことを報告した¹⁾。今回の研究は三叉神経へ痛みとして電気刺激を行い, 刺激前後で, 副腎髄質から分泌されるカテコールアミンを副腎静脈より採血する。これより三叉神経電気刺激時に交感神経一副腎髄質系の内分泌に及ぼす影響を検討した。

《対象および方法》実験系としてはWistar系ラットをハロセンで麻醉導入し臭化パンクロニウムにて不動化し気管切開後, 人工呼吸で0.5%ハロセンにて麻醉維持した。血圧測定は大腿動脈から観血的に行った。刺激電極は歯科用リーマーを用いて, 上顎左右切歯歯髄を露髓させた

後, 歯髄腔へ挿入した。電気刺激条件は刺激強度5.0mA, 接続時間500μ secの矩形波を, 50Hz, 10秒間刺激した。また腹部に切開を加え, 副腎静脈へポリエチレンチューブを挿入し採血した。なお採血は電気刺激開始前と刺激終了後に, 血圧測定は刺激前60秒から刺激後60秒まで15秒間隔で行った。血漿カテコールアミン濃度は高速液体クロマトグラフィーにて測定した。

《結果および考察》副腎静脈中カテコールアミン濃度は三叉神経電気刺激前と比較して, 刺激後にノルエピネフリン濃度が176%, エピネフリン濃度が181%の上昇を認めた。したがって三叉神経電気刺激は刺激直後に交感神経一副腎髄質系の内分泌へ影響を与えることが示唆された。今後刺激後経時に検討する必要性が認められた。

文献 1) : 今崎達也 他: 日歯誌, 1992, 20 (3), 460-471

28. 局所麻酔注射時における血漿カテコールアミンの変動

○河合 拓郎, 新家 昇, 加藤 元康,
大桶 華子, 工藤 勝, 國分 正廣
(北海道医療大学歯学部歯科麻酔学講座)

《目的》歯科処置中における偶発症や基礎疾患の増悪は局所麻酔注射時に多く起こることが知られている。その原因は局所麻酔注射の窩刺や注入時の痛みなどによって分泌されるカテコールアミン, 局所麻酔薬添加エピネフリンが考えられている。今回, 口腔内へ局所麻酔注射した時の血漿カテコールアミン濃度に及ぼす影響を経時に検討した。

《対象および方法》Wistar系ラットを用いて副腎静脈と大腿動脈の血漿カテコールアミン濃度を比較検討した。麻酔導入はハロセンで行い, 臭化パンクロニウムにて不動化し気管切開後, 人工呼吸下で0.5%ハロセンにて麻醉維持した。なお採血は副腎静脈と大腿動脈で行った。またその他の指標として大腿動脈より観血的動脈圧測定をした。局所麻酔注射は2%リドカイン (1/8万エピネ